AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS • DIVISION OF EDUCATION
ACCREDITED EDUCATION INSTITUTES
ENHANCING PATIENT SAFETY THROUGH SIMULATION
Accredited Education Institute

ROEYA
Training Center

Endo BulVision

Endo BulVision Master Edition 2026

November 6-7, 2026
Medical University - Pleven,
Telecommunication Endoscopic Center (TELEC)

OLYMPUS

FUJIFILM

Boston Scientific

VIATRIS

NESTMAR MEDICAL

MICRO ECIVE D

erbe

Program 1: Resection Techniques (Polypectomy, EMR, ESD)

Day 1 (Friday, 06.11)

Time	Activity	Speaker
09.30-10.00	Registration	
10.00-10.15	Opening Ceremony	Zornitsa Gorcheva
10.15-10.30	Polypectomy Techniques: Cold Snare, Hot Snare and EMR for Small Polyps	Zornitsa Gorcheva
10.30-10.45	Management of Difficult and Large Colorectal Polyps	Alexander Katzarov
10.45-11.00	Prevention and Management of Colonoscopy & Polypectomy Complications	Alexander Katzarov
11.00-11.30	Coffee break	
11.30-13.00	Session I – Colonoscopy Hands-on	
13.00-13.30	Lunch break	
13.30-16.00	Session II – Polypectomy Hands-on	

Day 2 (Saturday, 07.11)

Time	Activity	Speaker
09.00-09.15	Lesion Assessment and Optical Diagnosis Before Resection	Alexander Katzarov
09.15-09.30	Advanced ESD Techniques: Tips and Tricks	Alessandro Rimondi
09.30-09.45	Management of Adverse Events Following EMR & ESD	Alessandro Rimondi
09.45-10.30	Coffee break	
10.30-12.00	Session III – EMR Hands-on	
12.00-12.45	Lunch break	
12.45-14.30	Session IV – ESD Hands-on	
14.30-15.00	Closing Ceremony	

Program 2: Mastering Interventional EUS

Day 1 (Friday, 06.11)

Time	Activity	Speaker
09.30-10.00	Registration	
10.00-10.15	Opening Ceremony	Zornitsa Gorcheva
10.15-10.30	Fundamentals of Interventional EUS	Wafaa Khannoussi
10.30-10.45	EUS-Guided Tissue Acquisition: FNA vs FNB	Matteo Tacelli
10.45-11.30	Coffee break	
11.30-13.00	Session I – EUS-FNB Hands-On	
13.00-13.30	Lunch break	
13.30-16.00	Session II – EUS-Guided Pancreatic Cyst Drainage Hands-On	

Day 2 (Saturday, 07.11)

Time	Activity	Speaker
09.00-09.15	EUS-Guided Pancreatic Cyst Drainage: Indications and Techniques	Wafaa Khannoussi
09.15-09.30	Troubleshooting and Management of EUS-Related Complications	Matteo Tacelli
09.30-10.30	Coffee break	
10.30-12.00	Session III – EUS-FNB Hands-on	
12.00-12.45	Lunch break	
12.45-14.30	Session IV – EUS-Guided Cyst Drainage Hands-on	
14.30-15.00	Closing ceremony	


Program 3: Mastering ERCP

Day 1 (Friday, 06.11)

Time	Activity	Speaker
09.30-10.00	Registration	
10.00-10.15	Opening ceremony	Zornitsa Gorcheva
10.15-10.30	Updates in ERCP Indications: Navigating Diagnostic vs. Therapeutic Dilemmas	Mostafa Ibrahim
10.30-10.45	Complications in ERCP: A Systematic Approach to Risk Reduction and Management	Petko Karagyozov
10.45-11.00	ERCP in altered anatomy and difficult cannulation – tips for experts	Petko Karagyozov
11.00-11.30	Coffee break	
11.30-13.00	Session I – ERCP Hands-on	
13.00-13.30	Lunch break	
13.30-16.00	Session II – ERCP Hands-on	

Day 2 (Saturday, 07.11)

Time	Activity	Speaker
09.00-09.15	Navigating Complex Biliary Stones: Advanced Extraction Techniques and Lithotripsy	Mostafa Ibrahim
09.15-09.30	The Essentials of ERCP Stenting: Principles, Techniques, and Successful Deployment	Petko Karagyozov
09.30-09.45	Hilar Malignancies: Decision Making for Biliary Drainage	Petko Karagyozov
09.45-10.30	Coffee break	
10.30-12.00	Session III – ERCP Hands-on	
12.00-12.45	Lunch break	
12.45-14.30	Session IV – ERCP Hands-on	
14.30-15.00	Closing ceremony	



ДОВЕРИЕ НЕПРЕХОДНО ВЪВ ВРЕМЕТО[1]

500 mg gastro-resistant tablets
500 mg powder and solvent for solution for injection

Подобрение в биохимичните маркери при пациенти с интрахепатална холестаза и хронично чернодробно заболяване*[2,3,4,5]

S-adenosylmethionine

Transmetil®

Облекчаване на типичните симптоми на интрахепатална холестаза като иктер, пруритус и умора[4,5]

Единствената инжекционна форма 500 mg ademetionine в България[1]

*Transmetil® е показан за лечение на възрастни с интрахепатална холестаза при прецирозни и цирозни състояния; лечение на възрастни с интрахепатална холестаза по време на бременност.

Референции: 1. IQVIA data Dec 2025, Bulgarian market. **2.** Saigal S, et al. Ademetionine in patients with liver disease: a review. Int J Res Med Sci. 2019;7(6):2482-2493. **3.** Ivashkin V, et al. Open-label study of ademetionine for the treatment of intrahepatic cholestasis associated with alcoholic liver disease. Minerva Gastroenterologica e Dietologica 2018 September;64(3):208-19. **4.** Virukalpattigopalratnam MP, et al. Heptral® (ademetionine) in patients with intrahepatic cholestasis in chronic liver disease due to non-alcoholic liver disease: results of a multicentre observational study in India. J Indian Med Assoc.2013;111(12):856-9. **5.** Fiorelli G, S-Adenosylmethionine in the treatment of intrahepatic cholestasis of chronic liver disease: A field trial. Current Therapeutic Research Vol. 60, No. 8, Aug 1999

Лекарствена форма: 500 mg стомашно-устойчиви таблетки; 500 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор. **Количествен и качествен състав:** една таблетка съдържа 500 mg адеметионин; един флакон с лиофилизиран прах съдържа 500 mg адеметионин. **Показания:** лечение на възрастни с интрахепатална холестаза при прецирозни и цирозни състояния; лечение на възрастни с интрахепатална холестаза по време на бременност. **Дозировка:** лечението може да започне с инжекционната форма и да продължи с таблетната форма или да започне директно с таблетна форма; инжекционна форма – начално лечение: препоръчителната дозировка е 5-12 mg/kg дневно интравенозно или интрамускулно; обичайната начална доза е 500 mg/ден интравенозно или интрамускулно, като общата дневна доза не трябва да надхвърля 1 000 mg за 2 седмици; таблетна форма – начално лечение: препоръчителната дозировка е 10-25 mg/kg/ден приета перорално; обичайната начална доза е 800 mg/ден, като общата дневна доза не трябва да надхвърля 1 600 mg; поддържащо лечение: 800 до 1 600 mg дневно, приети перорално; ефективността и безопасността при деца не са установени; фармакокинетичните параметри при здрави доброволци и пациенти с хронично чернодробно заболяване са подобни; при пациенти с бъбречно увреждане приложението да става с повишено внимание; при пациенти в старческа възраст лечението трябва да се започне от ниските дози. **Противопоказания:** пациенти с генетичен дефект, засягащ метиониновия цикъл и/или причиняващ хомоцистинурия и/или хиперхомоцистеинемия (напр. цистатионин-бета-синтетазен дефицит, дефект на метаболизма на витамин B12); свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. **Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба:** да се наблюдават нивата на амоняк при прецирозни и цирозни състояния; при дефицит на витамин B12 и/или фолати се препоръчва лечение с витамин B12 и/или фолати преди или едновременно с приема на адеметионин; не се препоръчва при пациенти с биполярна болест; има данни за преходна или влошаваща се тревожност при пациенти, които са лекувани с Трансметил. **Взаимодействие с други лекарствени продукти:** повишено внимание при комбинирано приемане със селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), трициклични антидепресанти (като кломипрамин) и лекарства, отпускани без рецепта и хранителни добавки, съдържащи триптофан. **Фертилитет, бременност и кърмене:** препоръчва се да се прилага в първите три месеца на бременността само ако това е абсолютно необходимо; да се прилага в периода на кърменето само ако потенциалната полза надвишава риска за кърмачето. **Нежелани лекарствени реакции:** *чести (≥1/100 до <1/10)* - коремна болка, диария, гадене, главоболие, безпокойство, безсъние, пруритус; *нечести (≥1/1 000 до <1/100)* - сухота в устата, диспепсия, метеоризъм, стомашно-чревна болка, стомашно-чревно кървене, стомашно-чревни нарушения, повръщане, астения, оток, пирексия, втрисане, реакции на мястото на инжектиране, некроза на мястото на инжектиране, свръхчувствителност, анафилактоидни или анафилактични реакции (напр. зачервяване на лицето, диспнея, бронхоспазъм, болка в гърба, дискомфорт в гърдите, промени в кръвното налягане (хипотония, хипертония) или честотата на пулса (тахикардия, брадикардия)), инфекции на пикочните пътища, артралгия, мускулни спазми, замайване, парестезия, дисгеузия, възбуда, състояние на обърканост, оток на ларинкса, хиперхидроза, ангиоедем, алергични кожни реакции (напр. обрив, сърбеж, уртикария, еритема), горещи вълни, хипотония, флебит; *редки (≥1/10 000 до <1/1 000)* - подуване на корема, езофагит, физическо неразположение.

По лекарско предписание!
Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Transmetil®.
За пълна информация: Виатрис ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

BG-TRA-06 (01/2026)
Уведомление: ИАЛ-20545/15.05.2026

VIATRIS